

Démonstration du minimum de déviation du prisme

L'angle de déviation D vaut : $D=i-r+i'-r'$

Or $A=r+r'$ où A est l'angle au sommet du prisme.


D'où $D=i+i'-A$.

D est minimum quand $\frac{dD}{di} = 0$ soit $1 + \frac{di'}{di} = 0$ et donc $di' = -di$

Or les lois de la réfraction à l'entrée et à la sortie donnent

$$(1) \sin(i) = n \cdot \sin(r)$$

$$(2) \sin(i') = n \cdot \sin(r')$$



En différenciant (1) et (2), on obtient $\cos(i) di = n \cdot \cos(r) dr$ et $\cos(i') di' = n \cdot \cos(r') dr'$. Il suffit d'en faire ensuite le rapport pour obtenir : $\frac{\cos(i) di}{\cos(i') di'} = \frac{\cos(r) dr}{\cos(r') dr'}$ (3)

Or on a montré que $di = -di'$ et en différenciant $A=r+r'$, on obtient de même que $dr = -dr'$. En remplaçant dans (3), on a alors : $\frac{\cos(i)}{\cos(i')} = \frac{\cos(r)}{\cos(r')}$

On obtient alors facilement que $\frac{1-\sin(i)^2}{1-\sin(i')^2} = \frac{1-\frac{\sin(i)^2}{n^2}}{1-\frac{\sin(i')^2}{n^2}}$ soit encore $\frac{1-\sin(i)^2}{n^2-\sin(i)^2} = \frac{1-\sin(i')^2}{n^2-\sin(i')^2}$ (4)

Pour résoudre cette équation, il faut donc étudier la fonction $f(x) = \frac{1-x}{n^2-x}$ pour $x > 0$

Dérivons : $f(x) = \frac{-1}{n^2-x} + \frac{1-x}{(n^2-x)^2} = \frac{1-n^2}{(n^2-x)^2} < 0$ car $n > 1$

La fonction f est monotone décroissante donc injective. L'équation (4) admet donc pour solution unique $i = i'$. Cela entraîne immédiatement que $r = r'$.

Alors $D_m = 2i - A = 2 \arcsin\left(n \sin\left(\frac{A}{2}\right)\right) - A$

Soit $\frac{A+D_m}{2} = \arcsin\left(n \sin\left(\frac{A}{2}\right)\right)$

On en déduit la formule classique donnant l'indice du verre du prisme en fonction de D_m :

$$n = \frac{\sin\left(\frac{A+D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

Le tracé des rayons lumineux au minimum de déviation est donc le suivant :

